

เตือนภัย!

หนอนด้วงหนวดยาวระบาดในอ้อย

ด้วงหนวดยาว จัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญต่อการปลูกอ้อย โดยสามารถเข้าทำลายต้นอ้อย ตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกลงถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยหนอนของด้วงหนวดยาว จะเข้าไปในส่วนของลำต้นอ้อย ที่อยู่ใต้ดิน เจาะซอนไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในลำต้น ทำให้อ้อยแห้งตาย

การป้องกัน - กำจัดหนอนด้วงหนวดยาว

- 

เมื่อมีการไถที่เตรียมดิน ควรเก็บตัวหนอนออกจากพื้นที่ 1-2 ครั้ง
- 

การควบคุมโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม โรยบนท่อนพันธุ์ในอัตราส่วน 20 กก./ไร่
- 

ใช้สารกำจัดแมลงฟิโพรนิล ฉีดพ่นหลั้ววางท่อนพันธุ์ตอนเตรียมดิน
- 

เดือน มี.ค. - เม.ย. ขุดหลุมเพื่อดักจับด้วงตัวเต็มวัย 40 หลุม/ไร่ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยไปวางไข่
- 

ปลูกพืชหมุนเวียน สลับกับการปลูกอ้อย
- 

ส่งเสริมให้มีการนำหนอนด้วงไปประกอบเป็นอาหาร

* สารกำจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิดอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

เตือนภัยหนอนด้วงหนวดยาวระบาดในอ้อย 🐛

จากสถานการณ์แล้งที่ผ่านมาในปี 2562 พบมีการระบาดของด้วงหนวดยาวในอ้อยเขตนอกชลประทานจำนวนมาก และปีนี้มีข้อมูลเบื้องต้นพบการระบาดรุนแรงมากกว่า คือพบการระบาดทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ในระยะเริ่มปลูกอ้อยหนอนจะเจาะซอนไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้อ้อยไม่สามารถงอกได้ หรือเมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน เป็นช่วงเริ่มแตกกอ หนอนจะกัดกินบริเวณโคนอ้อยที่ติดกับเหง้า ทำให้ท่อนอ้อยแห้งตาย ส่วนในอ้อยโตเป็นลำจะพบว่ากาบใบและใบอ้อยแห้งมากกว่าปกติ ตั้งแต่ใบล่างจนแห้งตายไปทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย โดยหนอนขนาดเล็กกัดกินบริเวณเหง้าอ้อย เมื่อหนอนโตขึ้นจะเริ่มเจาะไชส่วนโคนของลำอ้อยขึ้นไปเพื่อกินเนื้ออ้อย ทำให้ลำต้นอ้อยเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก ซึ่งส่งผลให้ลำต้นอ้อยหักล้มและแห้งตายได้

การป้องกันและกำจัด

- เมื่อมีการไถที่เตรียมดิน ควรเก็บตัวหนอนออกจากพื้นที่ 1-2 ครั้ง
- การควบคุมแบบชีววิธีโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม โรยลงบนท่อนพันธุ์พร้อมการปลูกอ้อย ในอัตราส่วน 20 กก./ไร่ โดยเชื้อราจะสามารถอยู่ในดินและป้องกันตัวหนอนได้เป็นปี
- แหล่งที่มีการระบาด ควรมีการใช้สารฆ่าแมลงฟิโพรนิล ในอัตราส่วน 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลั้ววางท่อนพันธุ์ หรือไถดักลูกดอนเตรียมดิน มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรซินเจนทา
- ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกอ้อย เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ปอเทือง เป็นต้น

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัยแล้ง อาจเกิดผลกระทบกับ 'ถั่วเหลือง'

จากข้อมูลของคณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตรได้เตือนภัยแล้งเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่กำลังเกิดผลกระทบกับเกษตรกรไทยในขณะนี้ ทำให้ต้องคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้สามารถปลูกพืชได้ในสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้น ซึ่งจะต้องจัดการพืชแบบผสมผสาน รวมถึงรักษาความอุดมสมบูรณ์ในดินจะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและทนต่อศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี

โดยสภาพแวดล้อมอากาศที่แห้งแล้ง พืชที่อาจเกิดผลกระทบคือ 'ถั่วเหลือง' ซึ่งมักจะพบกับหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วซึ่งเข้าทำลายถั่วเหลืองตั้งแต่ระยะต้นกล้า เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจากไข่จะซ่อนไปตามใบไปทั่วทั้งต้นเพื่อเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อของลำต้นที่บริเวณไส้กลางลำต้น การเข้าทำลายของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 40 % มีแนวทางป้องกัน/แก้ไขดังนี้

คลุกเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกด้วยสารกำจัดแมลง มิตาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูเอส อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม

พ่นด้วยสารกำจัดแมลง ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

สารกำจัดแมลงฟิโพรนิล 4% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน พ่นครั้งแรกเมื่อใบจริงคู่แรกคลี่เต็มที่หรือ อายุประมาณ 7 - 10 วันหลังออก

สารกำจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิดอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด



เขียนความคิดเห็น...



ศัตรูพืชช่วงภัยแล้ง หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วเหลือง

การปลูกถั่วเหลืองช่วงฤดูแล้ง มักพบกับหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว ซึ่งเข้าทำลายถั่วเหลืองตั้งแต่ระยะต้นกล้า เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจากไข่จะซ่อนไปตามใบไปทั่วทั้งต้นเพื่อเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อของลำต้นที่บริเวณไส้กลางลำต้น ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 40 %

แนวทางป้องกันหนอนแมลงวัน

- คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารฆ่าแมลง imidacloprid 70% WS อัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
- โรยสารกำจัดแมลง carbofuran 3% G อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ รองกันหลุมก่อนปลูก
- เมื่อถั่วเหลือง อายุประมาณ 7-10 วัน โดยพ่นด้วยสาร Triazophos 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และพ่นซ้ำอีกครั้ง ห่างจากครั้งแรก 7 วัน

* สารกำจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิดอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีป้องกันอันตรายจาก “โคโรน่า...ไวรัสสายพันธุ์ใหม่”

syngenta



Syngenta

ถูกใจเพจนี้ - 21 กุมภาพันธ์ -

👉 5 วิธีป้องกันอันตรายจาก “โคโรน่า...ไวรัสสายพันธุ์ใหม่”

“ไวรัสโคโรน่า” (Covid-19) ที่กำลังระบาดทั่วโลก ในขณะนี้ มีถิ่นกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน จุดกำเนิดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ โดยผู้ป่วยกลุ่มแรกที่มีพบส่วนใหญ่มีแหล่งสัมผัส จากตลาดสดที่มีการขายอาหารทะเล และสัตว์มีชีวิต อาการที่พบเมื่อติดเชื้อไวรัสชนิดนี้คือผู้ที่มาจากแหล่งระบาดของโรค พบอาการมีไข้ และอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มี น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก และทำให้ระบบหายใจล้มเหลวถึงกับเสียชีวิตได้จากปอดอักเสบ ดังนั้นวันนี้เราจะนำเสนอ 5 ข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค เพื่อสุขภาพร่างกายของตนเองและคนรอบข้าง ดังนี้

1. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด
2. ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์
3. กินร้อน ช้อนกลาง อาหารปรุงสุก พักผ่อนให้เพียงพอ
4. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในที่ชุมชนคนหนาแน่น
5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค

👍❤️ 20

1 ความคิดเห็น แชร์ 8 ครั้ง

👍 ถูกใจ 💬 แสดงความคิดเห็น ➦ แชร์ 📷

เกี่ยวข้องที่สุด



🔒 แฟนด้วย
Wasinee Mankong



เขียนความคิดเห็น...



แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค

ป้องกันตัวเองจาก PM2.5

ในวันที่ปัญหา PM 2.5 เป็นภัยใกล้ตัว
เรามีวิธีป้องกันภัยเงียบที่คอยทำลายร่างกายมนุษย์
เพื่อการป้องกันอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ในเมืองที่เปื้อนฝุ่น

syngenta



Syngenta

26 มกราคม

ใส่หน้ากากอนามัยแบบกรองฝุ่นที่ป้องกัน PM 2.5 ได้



หลีกเลี่ยงการออกจากอาคารบ้านเรือน
เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสฝุ่นพิษ

ปิดประตู-หน้าต่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าบ้าน
ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/สตรีมีครรภ์/เด็ก/ผู้สูงอายุ
ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ



ดื่มน้ำให้มากๆ
งดสูบบุหรี่



ไม่เผาขยะที่สร้างมลพิษทางอากาศ
ลดการใช้รถยนต์เพื่อลดมลพิษ

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
กรมควบคุมโรค / กระทรวงสาธารณสุข



วิธีป้องกัน PM 2.5 ภัยเงียบทำลายร่างกายมนุษย์

ในวันที่ปัญหา PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเร
เป็นอย่างมาก ทั้งแสบตา หายใจลำบาก หรือหนัก
จนกระทั่งทำลายระบบในร่างกายของเรา เราจะ
ต้องเตรียมพร้อมรับมือในการป้องกันตนเอง

วันนี้ขอแนะนำ 10 วิธีป้องกัน PM 2.5

1. ใส่หน้ากากอนามัยแบบกรองฝุ่นที่ป้องกัน PM 2.5 ได้
2. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในตัวอาคาร
3. ให้อยู่ในอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
4. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงาน
หนักเมื่อออกนอกบ้าน
5. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ปิดจมูกและปาก
6. พยายามดื่มน้ำให้มาก ๆ
7. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/สตรีมีครรภ์/เด็ก/ผู้สูงอายุ ต้อง
ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
8. ไม่เผาขยะที่สร้างมลพิษทางอากาศ
9. ลดการใช้รถยนต์เพื่อลดมลพิษ
10. เตรียมยาประจำตัว หากมีอาการผิดปกติให้รีบ
ไปพบแพทย์

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 โรคได้แก่ : โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเยื่อตา
อักเสบ โรคผิวหนัง

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค / กระทรวงสาธารณสุข

แอดไลน์ ชินเจนทา : <http://nav.cx/3bgA1X>
/ชินเจนทา (SYNGENTA)

13

1 ความคิดเห็น
แชร์ 4 ครั้ง



เขียนความคิดเห็น...



เกษตรกรนาบัวคึกคักช่วงวันมาฆบูชา

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันมาฆบูชา เกษตรกรนาบัวจะคึกคัก
ร้านดอกไม้สดจะสั่งจองดอกบัวเข้ามาอย่างล้นหลาม
และมียอดเพิ่มขึ้นเท่าตัว ส่งผลให้ราคาดอกบัวสูงขึ้นจากช่วงปกติ

5 เหตุผลที่ควรทำนาบัว

สามารถ
ปลูกในพื้นที่
น้ำท่วมซ้ำซาก
ได้ดี

ราคาเพิ่มสูงขึ้น
ตามความต้องการ
ของตลาด

สามารถลงบัว
ในฤดูแล้งได้
โดยวิธีย่ำคราด

สามารถเร่ง
ผลผลิตบัวได้
โดยวิธีสูบน้ำ
เข้าแปลง

ต้นทุน
เกษตรกรนาบัว
มีเพียงปุ๋ยและ
แรงงานเก็บฝัก

ในวันมาฆบูชา ทุก ๆ ปีเกษตรกรนาบัวมักจะคึกคักเนื่องจากมีร้านดอกไม้สดสั่งจองดอกบัวเข้ามาอย่างล้นหลามและมียอดเพิ่มขึ้นเท่าตัว เหล่าเกษตรกรจึงเร่งเก็บดอกบัวเพื่อให้ทันขายในวันมาฆบูชา เพื่อใช้ในการทำบุญไหว้พระ เวียนเทียน ส่งผลให้ราคาดอกบัวสูงขึ้นจากช่วงปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้ดอกบัวไม่เป็นที่ต้องการของตลาด กลับเป็นที่ต้องการของตลาดสูงจนขาดตลาดในหลายพื้นที่

แต่แม้ราคาดอกบัวจะเพิ่มสูงขึ้นเท่าไร ประชาชนยังคงมีความต้องการที่จะใช้ดอกบัวเพื่อนำไปทำบุญไหว้พระ สักการะพระพุทธรูป ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปัญหาภัยแล้งของไทยกลับสร้างผลกระทบต่อนาบัวรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากไม่มีน้ำจากเขื่อนปล่อยลงมา ทำให้เกษตรกรนาบัวได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง เพราะไม่สามารถเก็บเกี่ยวหรือปลูกบัวได้

ประโยชน์ของบัวที่ควรรู้

1. สามารถปลูกในพื้นที่น้ำท่วมได้ดี
2. ราคาเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการในตลาด
3. ใช้วิธีย่ำคราดและลงบัวในฤดูแล้งบัวจะปรับตัวและไม่ตาย
4. วิธีสูบน้ำเข้าแปลง ส่งผลให้บัวออกฝักก่อนฤดู
5. ต้นทุนเกษตรกรนาบัวมีเพียงปุ๋ยและแรงงานเก็บฝัก

แหล่งที่มา : เทคโนโลยีเกษตรกรชาวบ้าน

20

แชร์ 4 ครั้ง

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น แชร์



เขียนความคิดเห็น...



แหล่งที่มา : เทคโนโลยีเกษตรกรชาวบ้าน

7 อาหารจีนมงคล



ปลา

ความเจริญรุ่งเรือง



เกี๊ยว

ความมั่งคั่ง



ปอเปี๊ยะ

ความร่ำรวยเงินทอง



ผลไม้มงคล

ความสมบูรณ์และความมั่งคั่ง



เก๋าก๊าก

หน้าที่การงาน



บัวลอย

ครอบครัวอบอุ่น



ก๋วยเตี๋ยวเส้นยาว

ความสุขและอายุยืน

ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้ว วันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับ 7 อาหารมงคลจีน ตามแบบฉบับแท้ ๆ กินแล้วรวยรับตรุษจีน ได้แก่

1. ปลา – ความเจริญรุ่งเรือง
2. เกี๊ยว – ความมั่งคั่ง
3. ปอเปี๊ยะ – ความร่ำรวย
4. แฉกข้าว – หน้าที่การงาน
5. บัวลอย – ครอบครัวอบอุ่น
6. ก๋วยเตี๋ยวเส้นยาว – ความสุขและอายุยืน
7. ผลไม้มงคล – ความสมบูรณ์และความมั่งคั่ง

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับสินค้าทางการเกษตรเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและถูกหลักอนามัย อย่างชาวไทยเชื้อสายจีนทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ ชนิดต่าง ๆ ก็จะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยด้านปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรฯ โดยยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้บริโภคสินค้าอย่างปลอดภัยถูกหลักอนามัย

แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / Mushroom Travel

👍 25

1 ความคิดเห็น
แชร์ 5 ครั้ง

👍 ถูกใจ 🗨 แสดงความคิดเห็น ➡ แชร์ 🌐

เกี่ยวข้องกับ



Suki Brads Demand You
are what's you eat 55555

ถูกใจ · ตอบกลับ · 8 สัปดาห์

1



เขียนความคิดเห็น...

😊 📷 📺 📺


เตือนภัย!

หนอนด้วงหนวดยาวระบาดในอ้อย

ด้วงหนวดยาว จัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญต่อการปลูกอ้อย โดยสามารถเข้าทำลายต้นอ้อย ตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยหนอนของด้วงหนวดยาว จะเข้าไปในส่วนของลำต้นอ้อย ที่อยู่ใต้ดิน เจาะซอนไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในลำต้น ทำให้อ้อยแห้งตาย

การป้องกัน - กำจัดหนอนด้วงหนวดยาว

1.



เมื่อมีการไถที่เตรียมดิน ควรเก็บตัวหนอนออกจากพื้นที่ 1-2 ครั้ง

2.



การควบคุมโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม โรยบนท่อนพันธุ์ในอัตราส่วน 20 กก./ไร่

3.



ใช้สารกำจัดแมลงฟิโพรนิล ฉีดพ่นหลังวางท่อนพันธุ์ตอนเตรียมดิน

4.



เดือน มี.ค. - เม.ย. ขุดหลุมเพื่อดักจับด้วงตัวเต็มวัย 40 หลุม/ไร่ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยไปวางไข่

5.



ปลูกพืชหมุนเวียน สลับกับการปลูกอ้อย

6.



ส่งเสริมให้มีการนำหนอนด้วงไปประกอบเป็นอาหาร

* สารกำจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิดอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคำเตือน และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

เตือนภัยหนอนด้วงหนวดยาวระบาดในอ้อย

จากสถานการณ์แล้งที่ผ่านมาในปี 2562 พบมีการระบาดของด้วงหนวดยาวในอ้อยเขตนอกชลประทานจำนวนมาก และปีนี้ข้อมูลเบื้องต้นพบการระบาดรุนแรงมากกว่า คือพบการระบาดทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ในระยะเริ่มปลูกอ้อยหนอนจะเจาะซอนไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้อ้อยไม่สามารถงอกได้ หรือเมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน เป็นช่วงเริ่มแตกกอ หนอนจะกัดกินบริเวณโคนอ้อยที่ติดกับเหง้า ทำให้หน่ออ้อยแห้งตาย ส่วนในอ้อยโตเป็นลำจะพบว่ากาบใบและใบอ้อยแห้งมากกว่าปกติ ตั้งแต่ใบล่างจนแห้งตายไปทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย โดยหนอนขนาดเล็กกัดกินบริเวณเหง้าอ้อย เมื่อหนอนโตขึ้นจะเริ่มเจาะไชส่วนโคนของลำอ้อยขึ้นไปเพื่อกินเนื้ออ้อย ทำให้อ้อยเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก ซึ่งส่งผลให้ลำต้นอ้อยหักล้มและแห้งตายได้

การป้องกันและกำจัด

1. เมื่อมีการไถที่เตรียมดิน ควรเก็บตัวหนอนออกจากพื้นที่ 1-2 ครั้ง
2. การควบคุมแบบชีววิธีโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม โรยลงบนท่อนพันธุ์พร้อมการปลูกอ้อย ในอัตราส่วน 20 กก./ไร่ โดยเชื้อราจะสามารถอยู่ในดินและป้องกันตัวหนอนได้เป็นปี
3. แหล่งที่มีการระบาด ควรมีการใช้สารฆ่าแมลงฟิโพรนิล ในอัตราส่วน 80 มิลลิกรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลังวางท่อนพันธุ์ หรือไถคลุกตอนเตรียมดิน มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรซินเจนตา
4. ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกอ้อย เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ปอเทือง เป็นต้น

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2563

ภาคเหนือ



อากาศร้อนถึงร้อนจัด

▼18° ▲41°

หลีกเลี่ยงการเผาตอ
ซังข้าว ซังข้าวโพด

ภาคใต้



มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

▼21° ▲37°

ควรคลุมดินด้วยวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร

ภาคตะวันออก เฉิงเหนือ



ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

▼23° ▲41°

ควรคลุมดินด้วยวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร

ภาคตะวันออก



อากาศร้อนถึงร้อนจัด

▼24° ▲40°

ควรคลุมดินด้วยวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร


ภาคกลาง



อากาศร้อนถึงร้อนจัด

▼24° ▲41°

หลีกเลี่ยงการทำงาน
กลางแจ้งเป็นเวลานาน



☁️ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ☁️

ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2563

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม

พ.ศ.2563

☀️ ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส

👨🌾 ในช่วงวันที่ 16-18 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรที่ต้องเตรียมพื้นที่เพาะปลูกรอบใหม่ ควรหลีกเลี่ยงการเผาตอซังข้าว ซังข้าวโพด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

☁️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 10 ของพื้นที่

👨🌾 เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีก ควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทั้งจัดหาน้ำให้แก่สัตว์อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันสัตว์เครียดและเจ็บป่วย

☀️ ภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส

👨🌾 เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ

Sizzler : AW Insert menu the Vegan Meals
Insert menu : Size 20.5x30 cm
Artwork Scale : 1:1

HEALTHY CHOICE

100% PLANT BASED

Healthy Vegan Choice

ออมนิเคอร์รี่ สเต็ก กับ สปาร์เก็ตตี้ กะเพรา
Omni Curry Steak with Krapao Spaghetti
329.-
VG

บียอร์น คาราเมลไลซ์ ออนเนียน เบอร์เกอร์ และสไปซี่โคลสลอว์
Beyond Caramelized Onion Burger with Spicy Coleslaw
399.-
VG

ฟรี
สลัดบาร์ไม่อั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 10 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าของจะหมด)
*อาหารและภาชนะในภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

VG Vegan ! OMN!MEAT BEYOND MEAT

Sizzler STEAK • SEAFOOD • SALAD

*เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ และสำหรับรับประทานในร้านเท่านั้น, สลัดบาร์เมนูปกติ ไม่มีเมนู ! OMN!MEAT BEYOND MEAT

กลับมาอีกครั้งกับเมนูสุดพิเศษจาก Sizzler เอาใจสาย Vegan รักสุขภาพตามกระแสเทรนด์โลกอย่าง 'Plant-Based Meat' กับเมนูที่ทำจากพืช 100% ให้รสชาติและสัมผัสที่คล้ายเนื้อจริง ๆ โดยไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ กับสองเมนูใหม่

- ออมนิเคอร์รี่ สเต็ก กับ สปาร์เก็ตตี้ กะเพรา ในราคา **319.- บาท**

- บียอร์น คาราเมลไลซ์ ออนเนียน เบอร์เกอร์ และสไปซี่โคลสลอว์ ราคา **399.- บาท**

***ทั้งหมดนี้ทำมาจากพืช 100%**

ฟรี! สลัดบาร์ไม่อั้น

นอกจากความอร่อยแล้วยังให้คุณประโยชน์ที่มากกว่าเนื้อ ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน แคลเซียม ธาตุเหล็กที่สูงกว่าหลายเท่า แต่ปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลกลับไม่มีให้กังวลใจ

ลองเลยวันนี้ที่ซิชซ์เลอร์ทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63 เท่านั้น